

協賛（順不同）

ファイザー製薬株式会社
田辺製薬株式会社
三菱東京製薬株式会社
武田薬品工業株式会社
萬有製薬株式会社
藤沢薬品工業株式会社
塩野義製薬株式会社

後援（順不同）

宮城県教育委員会
仙台市教育委員会
河北新報

T/P比を考える。

ACE阻害剤オドリックはT/P比が約80%、
ゆるやかに安定した降圧効果がまる一日続きます。



【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

1. 本剤の成分に対し、過敏症の既往歴のある患者
2. 他のアンジオテンシン変換酵素阻害剤による血管浮腫の既往歴のある患者
[高度の呼吸困難を伴う血管浮腫があらわれることがある。]
3. デキストラン硫酸セロースを用いた吸着器によるアフェレーシス施行中の患者
[ショックを起こすことがある(添付文書【使用上の注意】③ 相互作用)の項参照。]
4. アクリロニトリルメタクリルスルホン酸ナトリウム眼(AN69[®])を用いた血液透析施行中の患者
[アオフィラキシー様症状を発現することがある(添付文書【使用上の注意】③ 相互作用)の項参照。]
5. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人(添付文書【使用上の注意】⑥ 妊婦、産婦、授乳婦等への投与)の項参照)

★【効能・効果】、【用法・用量】、【使用上の注意】等詳細は現品添付文書をご覧ください。

★資料は当社医薬情報担当者にご請求ください。

1998年12月作成 OC-JB52(C1-1)298-PI



指定医薬品 要指示医薬品：注意 医師等の処方せん・指示により使用すること。

ACE阻害剤

オドリック[®]錠 0.5mg 1mg

トランドラプリル製剤 ●薬価基準収載

Hoechst Marion Roussel


製造・販売：

ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社

〒107-8465 東京都港区赤坂二丁目17番51号

Hoechst[■]

ヘキスト・マリオン・ルセル
ヘキスト・グループ 70の製薬会社から



●禁忌、効能又は効果、用法及び用量、使用上の注意は添付文書をご覧ください。

HMG-CoA還元酵素阻害剤
高脂血症治療剤

メバロチン[®]

錠・錠10・細粒・細粒1%


指定医薬品 一般名/プラバスタチンナトリウム (薬価基準収載)



資料請求先

三共株式会社

〒103-8426 東京都中央区日本橋本町3-5-1



持続性組織ACE阻害剤

薬価基準収載

製造発売元

指定医薬品/要指示医薬品*

第一製薬株式会社



コバシル錠 2mg
4mg

資料請求先: 東京都中央区日本橋三丁目14番10号
ホームページアドレス
<http://www.daiichipharm.co.jp/>

提携先



一般名: ペリンドプリルエルブミン (perindopril erbumine)

*注意—医師等の処方せん・指示により使用すること

★効能・効果、用法・用量、禁忌および使用上の注意等につきましては、製品添付文書をご参照ください。

99.2

日本時間生物学会会誌 Vol.5, No.2 (1999) 平成 11 年 10 月発行

発行: 日本時間生物学会

(事務局) 〒464-8602 名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院
理学研究科 生命理学専攻内
TEL:052-789-2498/FAX:052-789-2963

(編集局) 〒464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院
生命農学研究科 応用分子生命科学専攻内
TEL&FAX:052-789-4066